

رسیدگی به استفاده بیش از حد افیون (Opioid)

مرحله‌ی زیر ره بلده پیچکاری naloxone ampoule انجام بیدید

1

ایمنی


نفر و جای شی ره بلده هر چیزی
نامن چک کید.



2

آیا استفاده بیش از حد افیون
استه؟ متوجه علائم باشید

- جواب نه میدیه
- سیاهی چیم شی شور نه موخره
- نفس کشیدون غیر معمولی - نفس کشیدون آهسته و کمزور یا خُرْخُر مونه؟
- پوست رنگ پریده یا یخ، لبا و سر انگشتا به رنگ آبی یا خاکی تبدیل شده



3

به سه صفر (000) زنگ دید


مه فکر نوم ای
یک استفاده بیش
از حد استه



4


نفر ره قد بغل شی
خواو بی دید

نفر ره به حالت خوب شدو
قرار بی دید.



5


سیزو ره د بمبه
پیچکاری وصل کید



6

بوتل پیچاری ره چرخ
بی دید


بوتل پیچکاری ره چرخ بی
دید یا فشار یا ضربه دید که
مایع د پایین شی بایه.



7

بوتل پیچاری ره بیگرید

قد یک دست از خود بوتل
پیچکاری بیگرید و قد دیگه
دست سرکوله شی ره
فشار بی دید.




د صفحه بعدی ادامه دیره

11

یک دوز naloxone ره بی دید


دوز کامل naloxone ره تزریق کید. د صورت ضرورت می تنید از بله کالای شی تزریق کنید.



10

سیزو ره د جای شی قرار بی دید


سیزو ره د قسمت بیرونی ران یا قسمت بالای دست داخل کید.



9

NALOXONE ره د بین بمبه پیچکاری کش کید


بوتل پیچکاری یک دوز کامل naloxone ره جای مونه.



8

سر بوتل پیچاری ره کنده کید


سرکوله بوتل پیچکاری ره دورتر از خود خو کنده کید. از دستمال کاغذی یا سرپوش قلم بلده کمتر کیدون خطر اوگار شدو استفاده کید.



14

د صورت نیاز دوز ره تکرار کید

اگه تاثیر نکد، هر 2 تا 3 دقه یک دوز بلده شی دده بورید تاکه نفر خوبتر شونه یا امبولانس بیرسه.



13

خوب شدو


نفر ره به حالت خوب شدو قرار بی دید. تا امبولانس نمده پیش شی بی شید.



12

آیا نفر نفس میکشه؟

اگه نه میکشه، اگه موفامید از نفس ددو بلده نجات استفاده کید - نفر ره قد پشت شی خاو بی دید و 2 نفس بی دید.



از naloxone بلده برعکس کیدون مصرف بیش از حد (مواد افیونی (مانند هروئین، مورفین، متادون، اکسی کدون، افیونای تجویزی، fentanyl) استفاده کنید. از 2 تا 5 دقه ره وقت میگره تاکه تاثیر شی شروع شونه و از 30 تا 90 دقه ره دوام مونه.

بلده دریافت از ی سند به یک قالب دیگه به نشانی
aod.enquiries@health.vic.gov.au ایمیل کید

اجازه دده شده و نشر شده توسط دولت ویکتوریا، 1 Treasury Place, Melbourne

قابل دسترس به <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>