

# 類阿片藥物過量反應

請依照以下步驟進行 Prenoxad 納洛酮注射液

1

## 安全


檢查人員和區域是否有任何不安全的情況。



2

## 類阿片藥物過量？ 尋找跡象

- 沒有反應
- 瞳孔放大
- 呼吸不正常—呼吸淺慢或打鼾
- 皮膚蒼白或冰冷，嘴唇和指尖呈藍色或灰色



3

## 撥打三個零 (000)


我認為有人服藥過量



4


## 將患者側躺

將患者置於復原臥式。



5

### 將針頭旋入 PRENOXAD 預充式注射器上



6

### 注射位置


將針插入大腿外側或上臂。



7

### 給予一劑納洛酮


注射 0.4mL，直到注射器上的第一條黑線 (Prenoxad 注射器包含 5 劑)。



8

### 他們有呼吸嗎？


如患者沒有呼吸，且您知道如何進行人工呼吸 – 請讓患者仰臥並向他們進行 2 次人工呼吸。



9

### 復原


將患者置於復原臥式。留在他們身邊直到救護車到達現場。



10

### 如有需要，請重複劑量

如果沒有反應，每 2 至 3 分鐘再注射 0.4 毫升劑量 (到下一條黑線)，直到患者康復或救護車到達。



使用納洛酮逆轉類阿片藥物過量 (例如海洛因、嗎啡、美沙酮、羥考酮、處方類阿片藥物、芬太尼)。  
納洛酮需要 2-5 分鐘才會發揮效用，並持續約 30-90 分鐘。

若要以其他格式接收此文檔，請傳送電子郵件 <aod.enquiries@health.vic.gov.au>。

經新南威爾斯州衛生局許可轉載 © 2023。

由維多利亞州政府授權和出版，地址：1 Treasury Place, Melbourne。© 澳洲維多利亞省衛生部，

ISBN 978-1-76131-460-5 (pdf/online/MS word)。

可從該部門的網站 <<https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>>。

2023 年 11 月。(2303380)。