

疫苗副作用

接種疫苗後請至少等候 15 分鐘。

請參閱下頁，以了解所有疫苗的常見副作用。

疫苗接種日期 (本日) : ____ / ____ / 20 ____。疫苗接種時間 _____。

透過勾選對應的方塊來指示注射部位：RA=右臂，LA=左臂，RL=右腿，LL=左腿。

輪狀病毒疫苗	白喉-破傷風-百日咳-小兒麻痺-乙型肝炎-乙型流感嗜血桿菌 (Hib)* 疫苗	肺炎鏈球菌疫苗	腦膜炎球菌 ACWY 型疫苗
有些嬰兒会将轮状病毒疫苗随粪便排出。 在接下来的一周内，请在更换或处理脏尿布后注意手部卫生。 口服	*流感嗜血杆菌 (b 型) (<i>Haemophilus influenzae</i> type b) RA LA RL LL	RA LA RL LL	RA LA RL LL
乙型流感嗜血桿菌 (Hib) 疫苗	白喉-破傷風-百日咳 (呼吸咳) 三合一疫苗	麻疹-腮腺炎-德國麻疹-水痘疫苗	麻疹-腮腺炎-德國麻疹疫苗
RA LA RL LL	部分 18 月齡嬰幼兒在接種疫苗後，針口可能會出現大範圍紅腫，由肩部延伸至手肘。家長應將此情況告知免疫接種服務提供者或維多利亞州疫苗安全服務（聯絡方式見背面）。 RA LA	接種疫苗後約 7 至 10 天，或會出現以下症狀： - 發燒（可超過 39°C 以上） - 淡紅色皮疹（不具傳染性） - 感冒症狀 - 唾液腺腫脹。 接種疫苗後約 5 至 26 天： - 輕微水痘樣皮疹。 RA LA	接種疫苗後約 7 至 10 天，或會出現以下症狀： - 發燒（可超過 39°C 以上） - 淡紅色皮疹（不具傳染性） - 感冒症狀 - 唾液腺腫脹。 RA LA RL LL
白喉-破傷風-百日咳-小兒麻痺疫苗	人類乳頭瘤病毒 (HPV) 疫苗	水痘疫苗	B 型腦膜炎球菌 (Meningococcal B)
部分四歲幼童在接種疫苗後，針口可能會出現大範圍紅腫，由肩部延伸至手肘。家長應將此情況告知免疫接種服務提供者或維多利亞州疫苗安全服務（聯絡方式見背面）。 RA LA	- 輕微頭痛 - 輕微噁心。 RA LA	接種疫苗後約 7 至 10 天，或會出現以下症狀： - 發燒（可超過 39°C 以上）。 接種疫苗後約 5 至 26 天： - 發燒 - 輕微水痘樣皮疹。 RA LA	- 發燒（可超過 39°C 以上） - 兩歲以下嬰幼兒接種 Bexsero® 疫苗，建議在疫苗注射前 30 分鐘內或注射後盡快服用撲熱息痛。其後每隔 6 小時，再服食兩劑撲熱息痛。 RA LA RL LL
流感疫苗	帶狀皰疹 (生蛇) 疫苗	小兒麻痺疫苗	乙型肝炎疫苗
肌肉酸痛。 RA LA RL LL	- 注射部位發紅、疼痛、腫脹和/或發癢 - 腸胃不適 - 肌肉疼痛 - 疲倦、發冷、發燒 - 詳見背頁的罕有事故資料。 RA LA	肌肉酸痛。 RA LA	RA LA RL LL
呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗	其他		
- 疲勞 - 肌肉酸痛。 RA LA RL LL	RA LA RL LL		

常見的副作用通常會在接種疫苗後不久出現，並持續 1 至 2 天


接種疫苗可能引起以下反應：



輕微發燒（一般低於 38.5°C），且持續時間不長。



情緒煩躁、不安、情緒低落或嗜睡。



針口位置：可能會出現痛楚、發紅、灼熱感、痕癢或腫脹，通常持續 1 至 2 日，亦可能出現一個小硬塊，維持數星期。


在家應採取的措施：



如果孩子發燒，切勿穿著過多衣物或覆蓋過多被褥。可以服用撲熱息痛（請查看標籤以確保正確使用）。



更頻密地餵哺母乳及/或給予額外補充水分。



用凍毛巾敷在針口位置。


何時應求醫：



如服用撲熱息痛（例如：必理通®）後，痛楚及發燒仍未舒緩。



如果反應未有好轉或持續惡化，或者您感到擔心，請盡快看醫生或前往醫院求診。



極罕見的疫苗副作用，需即時就醫

- **熱性痙攣：**由高燒引起，通常發生於 3 歲以下的兒童。
- 兒童於接種疫苗後 1 至 48 小時內突然面色蒼白、全身軟弱無力及對外界刺激沒有反應。其後幼兒通常可迅速完全康復。
- **腸阻塞（腸套疊）：**當一段腸道滑入其相鄰的下一段腸道，就像望遠鏡筒節套疊般。此情況可能在兒童接種首劑或次劑輪狀病毒疫苗後的 7 天內出現。
腸阻塞的症狀包括：
 - 間歇性哭鬧
 - 持續嗜睡
 - 面色蒼白
 - 嘔吐
 - 因腹痛而將雙腿蹣縮至腹部。
- **手臂神經發炎（臂神經炎）：**會引致手臂感覺無力或麻痺。
- 突然發生的嚴重過敏反應（過敏性休克），通常在接種疫苗後 15 分鐘內發生，但亦可能在接種後數小時內出現。過敏反應初期的徵狀包括：
 - 皮膚發紅或發癢
 - 呼吸困難
 - 感到不適。
- **格林-巴利綜合症（Guillain-Barre syndrome）：**導致漸進性癱瘓，有時亦會引起麻痺。過去流感疫苗與此症的關聯甚少，或幾乎沒有。
- 接種帶狀皰疹（生蛇）疫苗後，可能出現以下反應：
 - 接種疫苗後 2 至 4 星期內出現類似水痘的皮疹
 - 感覺不適/發燒。

如果免疫接種後出現嚴重或意外的副作用，請以下列方式聯絡維多利亞州疫苗安全服務：

- 致電 1300 882 924
- 電子郵件 enquiries@saefvic.org.au
- 訪問 www.saefvic.org.au
- 或掃描二維碼。

此服務並不負責即時處理疫苗副作用的緊急情況。



護士諮詢熱線（NURSE-ON-CALL）：
從維多利亞州的任何地方撥打 1300 606 024 即可獲得全天 24 小時免費健康諮詢服務。如果您認為情況緊急，應立即致電 000 或前往醫院。



翻譯及傳譯服務。
致電 131 450

欲知詳情：請聯絡您的醫生、當地市議會疫苗接種服務機構或社區藥劑師，或瀏覽 www.betterhealth.vic.gov.au/urgent-care-services

如欲以無障礙格式索取本刊物，請電郵至：immunisation@health.vic.gov.au

資料改編自澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）。《澳洲免疫手冊》，澳洲政府衛生部，坎培拉，2025 年，網址：immunisationhandbook.health.gov.au。

經維多利亞州政府授權出版，地址：1 Treasury Place, Melbourne。© 維多利亞州，2025 年 2 月（2310610）

可於以下網址查閱：<https://www.health.vic.gov.au/publications/vaccine-side-effects>